



### Vaccin inactivé contre le tétanos pour équins, bovins, ovins, porcins et chiens

#### COMPOSITION :

Chaque dose de vaccin contient Anatoxine de *Clostridium tetani*  $\geq$  ... 30 U\*  
\*selon l'essai d'activité sur cobayes de la Pharmacopée Européenne.

#### INDICATIONS :

Chez les équins, bovins, ovins, porcins et canins : immunisation active contre le tétanos:

Traitement du tétanos en association avec la sérothérapie.

#### MODE, VOIE D'ADMINISTRATION ET POSOLOGIE :

Agiter avant l'emploi.

Respecter les conditions habituelles d'asepsie et de manipulation des animaux.

Utiliser pour l'injection du matériel stérile et dépourvu de toute trace d'antiseptique et/ou de désinfectant.

Chez les équins, injecter par voie intramusculaire de préférence au niveau de l'encolure et chez les bovins, chiens, ovins et porcs, injecter par voie sous cutanée ou intramusculaire, une dose de 1 ml selon les modalités suivantes :

A titre préventif : l'âge minimum des animaux au moment de la vaccination est de 4 mois.

-Primo-vaccination : Deux injections à 1 mois d'intervalle.

-Rappel :

1 an plus tard, puis tous les 3 ans.

Un rappel sera effectué après tout traumatisme suspect.

A titre curatif : Injecter une dose de 1 ml et simultanément en un autre point, pratiquer une injection de sérum antitétanique. Renouveler l'injection du produit 2 fois à 4-5 jours d'intervalle.

#### PRÉCAUTIONS :

-Ne vacciner que les animaux en bonne santé.

-Ne pas vacciner en sous-cutanée chez les équins.

-Ne pas vacciner au niveau de la croupe chez les équins.

- Utiliser pour l'injection du matériel stérile et dépourvu de toute trace d'antiseptique.

- Eviter tout stress une semaine avant et après vaccination.

-Chez les juments éviter la vaccination dans la semaine précédant ou dans les 21 jours suivant la saillie.

Chez les équins, en cas d'injection intramusculaire au poitrail, un œdème transitoire peut apparaître au point d'injection.

La présence d'hydroxyde d'aluminium peut entraîner l'apparition d'un petit nodule transitoire au point d'inoculation en cas d'injection par voie sous-cutanée.

-Exceptionnellement, la vaccination est susceptible de révéler un état d'hypersensibilité. Instaurer alors un traitement symptomatique.

#### CONSERVATION :

Conservé et transporté entre +2°C et +8°C et à l'obscurité. Ne pas congeler.

#### PRÉSENTATION(S) :

Boîte de 10 seringues de 1 dose.

