

BIAMOX 50[®]

Anti-infectieux pour volailles, bovins et équins

COMPOSITION :

Poudre orale.

Amoxicilline trihydrate-50 g

Excipient soluble q.s.p..... 100 g

PROPRIETES PHARMACEUTIQUES :

L'amoxicilline, pénicilline semi-synthétique, est active sur les bactéries Gram positif et Gram négatif. Elle agit par inhibition de la synthèse des parois bactériennes.

L'amoxicilline est caractérisée par :

- Une bonne absorption au niveau de la paroi intestinale (80%).
- Un faible taux de liaison plasmatique (15% environ).
- Diffusion large et rapide : la CMI est atteinte rapidement au niveau du sang et des tissus.
- Tropisme pulmonaire important : la concentration du mucus bronchique est le double de celle du sang.
- Lyse bactérienne plus rapide que celle obtenue avec d'autres pénicillines. Atoxique, l'amoxicilline est éliminée sous forme active par voie urinaire principalement.

Toutes ces caractéristiques de l'amoxicilline expliquent la remarquable activité bactéricide de BIAMOX.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Infections à germes sensibles à l'amoxicilline :

- Volailles : colibacillose, salmonellose, infections secondaires à *Escherichia coli*, infections respiratoires.
- Bovins : diarrhées bactériennes, pneumonie du veau.
- Équins : entérite, septicémie du poulain nouveau-né.

VOIE D'ADMINISTRATION ET POSOLOGIE :

20 mg d'Amoxicilline par kg de poids vif, correspondant à 0,04 g de BIAMOX 50/kg de poids vif.

Voie orale, dilué dans l'eau de boisson.

Durée du traitement : traiter une fois par jour pendant 3 à 5 jours.

CONTRE-INDICATIONS :

- Intolérance aux pénicillines.
- Ne pas administrer aux poules pondeuses dont les œufs sont destinés à la consommation humaine.
- Ne pas administrer aux lapins et aux cobayes.

DELAI D'ATTENTE :

Viandes et abats : 2 jours

PRESENTATIONS :

- Sachets de 100 g et de 200 g
- Pots de 500 g et de 1 kg
- Seaux de 2,5 kg et de 5 kg

PRODUIT M.C.I.