

COFALAC®

Traitement antibiotique en sachet-repas pour veaux
PRODUIT COOPHAVET

COMPOSITION :

Poudre orale

Colistine (s.f. de sulfate).....2,55 millions U.I.

Excipient nutritif q.s.p.....100 g

Excipient : chlorure de sodium, amidon de maïs, farines de caroube et de soja, acide citrique, saccharose, arôme.

PROPRIETES PHARMACEUTIQUES :

La colistine (ou polymyxine E) est un antibiotique bactéricide appartenant à la famille des polypeptides dont le spectre d'activité est exclusivement dirigé vers les bacilles Gram négatif (P. aeruginosa, E. coli, Pasteurella, Salmonella, Klebsiella).

Elle agit sur les bactéries sensibles par lyse pariétale.

Administrée par voie orale, son absorption par la muqueuse digestive est quasiment nulle, de ce fait, son activité sera limitée aux pathologies infectieuses du tube digestif.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Chez les veaux : affections gastro-intestinales à germes sensibles à la colistine.

VOIE D'ADMINISTRATION ET POSOLOGIE :

Voie orale.

- Veaux de 50 kg environ : 1 sachet de 100 g 2 fois par jour.
- Durée de traitement : pendant 2 jours consécutifs, distribuer COFALAC comme seule alimentation. Les 2 à 3 jours suivants, si l'état de l'animal le permet, reprendre progressivement l'alimentation habituelle en y ajoutant 1/2 sachet par buvée.

A distribuer en mélange à l'eau de boisson ou au lait. Disperser dans l'eau froide à raison de 100 g (1 sachet) dans 1/2 litre d'eau. Diluer ensuite avec 1 litre d'eau chaude de façon que la buvée médicamenteuse soit à la température de 35° à 38° au moment de sa distribution.

DELAI D'ATTENTE :

Viandes et abats : 7 jours

PRESENTATIONS :

Sachet de 100 g.

Boîte de 10 Sachets de 100 g.

Pots de 1 kg et de 5 kg.