

COLOX®

Vitaminothérapie pour Bovins, Ovins, Equins et Volailles

COMPOSITION :

Oxytétracycline chlorhydrate.....	5 g
Colistine sulfate.....	20 000 000 U. I.
Vitamine A.....	400 000 U. I.
Vitamine D3.....	70 000 U. I.
Vitamine K3.....	150 mg
Vitamine E.....	100 mg
Vitamine B 12.....	500 µg
Vitamine B 2.....	250 mg
Vitamine PP.....	1500 mg
Panthoténate de calcium.....	600 mg
DL-Méthionine.....	2500 mg
Lysine.....	4500 mg
Excipient soluble..... q. s. p.....	100 g

PROPRIETES PHARMACEUTIQUES :

La colistine, antibiotique polypeptidique, possède une activité marquée sur les germes négatifs, notamment colibacilles et salmonelles. Elle a une action bactéricide agissant aussi bien sur les bactéries en phase de repos que sur celles en phase de multiplication. Sa très faible absorption par la muqueuse intestinale lui confère une bonne efficacité sur les affections localisées au tube digestif.

L' oxytétracycline est un antibiotique doué d'un pouvoir bactériostatique intense sur la plupart des agents pathogènes : bactéries Gram positif (aérobies, anaérobies), actinomyces, mycoplasmes, spirochètes, rickettsies, chlamydie et certains protozoaires.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Chez volaille, veau et agneau :

- Prévention et traitement des maladies respiratoires chroniques (MRC) dues à des Haemophilus, des Pasteurella et surtout des Mycoplasmes.
- Prévention et traitement des gastro-entérites infectieuses, des arthrites (colibacillose, salmonelloses, pasteurelloses et choléra aviaire).
- Prévention au moment du stress : transport, vaccination, problème d' élevage.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

Prévention : 2 g par litre d'eau de boisson durant 3 à 5 jours au moment des stress et des périodes critiques d' élevage.

Traitement : 4 g par litre d'eau de boisson durant 3 à 5 jours dès l'apparition des premiers symptômes.

CONTRE INDICATIONS :

Hypersensibilité aux tétracyclines.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Arrêter le traitement si une diarrhée se manifeste au cours de celui-ci.
- Préparer la solution ou le mélange avec la ration le jour même de son utilisation.
- Ne pas dépasser les doses prescrites.

DELAI D'ATTENTE :

Viande et abats --: 7 jours

Oeufs -----: nul.

PRESENTATIONS :

Sachet 100 g,

Pot 1 kg,

Seaux 2,5 et 5 kg.

PRODUIT M.C.I.