

DOVENIX®

Fasciolicide injectable et buvable à base de nitroxinil
PRODUIT MERIAL

COMPOSITION :

Solution injectable et buvable :

NITROXINIL..... 25 g

Excipient q.s.p..... 100 ml

PROPRIETES PHARMACEUTIQUES :

DOVENIX® possède une longue persistance plasmatique, ce qui lui confère une activité prolongée.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Chez les bovins, ovins, caprins : Fasciolose hépatique à *Fasciola hepatica* et *Fasciola gigantica*, strongyloses gastro-intestinales à *Haemonchus*, *Oesophagostomum* et *Bunostomum*.

- Chez les ovins : œstrose.
- Chez les faisans : syngamose.
- Chez le chien : ankylostomose et uncinariose.

VOIE D'ADMINISTRATION ET POSOLOGIE :

Voies sous-cutanée, orale. La solution peut être diluée avec de l'eau pour préparations injectables afin de faciliter l'administration par voie sous-cutanée aux animaux de faible poids.

• Bovins, ovins, caprins :

---- Par voie sous-cutanée : 10 mg par kg, soit 1 ml pour 25 kg de poids vif.

• Faisans :

---- Par voie sous-cutanée : 15 mg par kg, soit 0,6 ml pour 10 kg de poids vif.

---- Par voie orale : 15 mg par kg, soit environ 0,5 ml par litre d'eau de

---- boisson. Réduire la posologie de moitié pour les

----faisandeaux âgés de moins de 5 semaines ou lorsque

----la consommation d'eau est augmentée (temps chaud).

• Chiens :

---- Par voie sous-cutanée : 10 mg par kg, soit 0,4 ml pour 10 kg de poids vif.

---- Par voie orale : 15 mg par kg, soit 0,6 ml pour 10 kg de poids vif.

• Traitement unique, à renouveler éventuellement à trois semaines d'intervalle en cas d'infestation massive.

CONTRE-INDICATION :

Ne pas administrer chez les faisanes pondeuses.

DELAI D'ATTENTE :

Viandes et abats : 30 jours.

Lait : 10 traites.

CONSERVATION :

Tenir à l'abri du gel et de la chaleur.

PRESENTATIONS :

Etui de 1 flacon de 50 ml.

Coffret de 10 flacons de 50 ml.

Coffret de 4 flacons de 250 ml.