

EURICAN CHPPI2-L[®]

Vaccin vivant lyophilisé de la maladie de Carré, des adénoviroses, de la parvovirose, des affections respiratoires à parainfluenza de type 2 du chien et inactivé et des leptospiroses à *Leptospira canicola* et *Leptospira icterohaemorrhagiae* du chien.

COMPOSITION :

- Lyophilisat
- Adénovirus canin (CAV2) atténué..... ---> 10^{2,5} DICC50
- Parvovirus canin atténué.....> 10^{4,9} DICC50
- Virus de la maladie de Carré atténué.....> 10^{4,0} DICC50
- Virus parainfluenza de type 2 atténué.....> 10^{4,7} DICC50
- Excipient Q.S.P. 1 dose de 1 ml :
- Stabilisant* q. s. p. 1 dose
- Suspension :
- *Leptospira canicola* inactivée
- *Leptospira icterohaemorrhagiae* inactivée } q.s.p. l'activité selon la monographie 447 de la pharmacopée européenne.
- Excipient Q.S.P. 1 dose de 1 ml :
- Eau pour préparations injectables.....q. s. p.....1,000 ml

PROPRIETES PHARMACEUTIQUES :

Après administration, le vaccin induit un état immunitaire contre le virus de la maladie de Carré, les adénoviroses (CAV1 et 2), la parvovirose, les affections respiratoires à parainfluenza de type 2 et les leptospiroses à *Leptospira canicola* et *Leptospira icterohaemorrhagiae* du chien démontré par épreuve virulente.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Chez les chiens :

Immunisation active contre la maladie de Carré, les adénoviroses, la parvovirose et les affections respiratoires à parainfluenza de type 2 et les leptospiroses à *Leptospira canicola* et *Leptospira icterohaemorrhagiae*.

VOIE D'ADMINISTRATION ET POSOLOGIE :

Une dose de 1 ml par voie sous-cutanée, selon les modalités suivantes

- Primovaccination
- 1ère injection : à partir de la 7ème semaine d'âge.
- 2ème injection : 3 à 5 semaines plus tard, dès la 12ème semaine d'âge.
- Rappels
- Annuels.

CONTRE-INDICATIONS :

Non connues

EFFETS INDESIRABLES :

La vaccination peut entraîner une réaction locale transitoire ainsi qu'une hyperthermie.

Exceptionnellement, la vaccination est susceptible de révéler un état d'hypersensibilité. Instaurer alors un traitement symptomatique.

PRECAUTIONS :

Ne vacciner que les sujets en parfait état de santé et correctement vermifugés 10 jours au moins avant l'injection.

DELAI D'ATTENTE :

Nul

CONSERVATION :

Conserver au réfrigérateur entre + 2°C et + 8°C et à l'abri de la lumière.

Après reconstitution, utiliser le vaccin immédiatement.

PRESENTATION :

Boîte de 10 flacons de 1 dose de lyophilisat et de 10 flacons de 1 ml de suspension.

PRODUIT MERIAL