

EURICAN CHPPI2-LR®

Vaccin vivant lyophilisé de la maladie de Carré, des adénoviroses, des affections respiratoires à parainfluenza de type 2 du chien et inactivé, des leptospiroses à *Leptospira canicola* et *Leptospira icterohaemorrhagiae* et de la rage du chien.

COMPOSITION :

- Lyophilisat
- | | |
|---|----------------------------|
| Adénovirus canin (CAV2) atténué | > 10 ^{2.5} DICC50 |
| Parvovirus canin atténué | > 10 ^{4.9} DICC50 |
| Virus de la maladie de Carré atténué | > 10 ^{4.0} DICC50 |
| Virus parainfluenza de type 2 atténué | > 10 ^{4.7} DICC50 |
- Suspension
- | | |
|--|---|
| Glycoprotéines rabiques..... | > 1 UI |
| <i>Leptospira canicola</i> inactivée..... | > 80 % de protection Au minimum q. s.
pour la protection |
| <i>Leptospira icterohaemorrhagiae</i> inactivée..... | > 80 % de protection selon ph. Européenne |
| Excipient..... | q. s. p.1 ml |

PROPRIETES PHARMACEUTIQUES :

Après administration, le vaccin induit un état immunitaire contre le virus de la maladie de Carré, les adénoviroses (CAV1 et 2), la parvovirose, les affections respiratoires à parainfluenza de type 2 et les leptospiroses à *Leptospira canicola* et *Leptospira icterohaemorrhagiae* et la rage du chien, démontré par épreuve virulente et par la présence d'anticorps

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Chez les chiens :

Immunisation active contre la maladie de Carré, les adénoviroses, la parvovirose et les affections respiratoires à parainfluenza de type 2, les leptospiroses à *Leptospira canicola* et *Leptospira icterohaemorrhagiae* et de la rage.

VOIE D'ADMINISTRATION ET POSOLOGIE :

Une dose de 1 ml par voie sous-cutanée, selon les modalités suivantes :

- Primovaccination

Une injection à partir de 12 semaines d'âge avec EURICAN CHPPI2-LR, 3 à 5 semaines avant ou après celle de EURICAN CHPPI2-L.

- Rappels
Annuels.

CONTRE-INDICATIONS :

Non connues

EFFETS INDESIRABLES :

La vaccination peut entraîner une réaction locale transitoire ainsi qu'une hyperthermie.

Exceptionnellement, la vaccination est susceptible de révéler un état d'hypersensibilité.

Instaurer alors un traitement symptomatique.

La présence d'hydroxyde d'aluminium peut parfois entraîner l'apparition d'un petit nodule transitoire au point d'injection.

PRECAUTIONS :

Ne vacciner que les sujets en parfait état de santé et correctement vermifugés 10 jours au moins avant l'injection.

En cas de risque épidémiologique important de leptospirose, un rappel semestriel est recommandé.

DELAI D'ATTENTE :

Nul

CONSERVATION :

Conserver au réfrigérateur entre + 2°C et + 8°C et à l'abri de la lumière.

Après reconstitution, utiliser le vaccin immédiatement.

PRESENTATION :

Boîte de 10 flacons de 1 dose de lyophilisat et de 10 flacons de 1 ml de suspension.

PRODUIT MERIAL