

# EURICAN CHPPI2®

## Vaccin vivant lyophilisé

### COMPOSITION :

- Lyophilisat :--- Adénovirus canin (CAV2) atténué ..... > 10<sup>2,5</sup> DICC50  
----- Parvovirus canin atténué ..... > 10<sup>4,9</sup> DICC50  
----- Virus de la maladie de Carré atténué ..... > 10<sup>4,0</sup> DICC50  
----- Virus parainfluenza de type 2 atténué ..... > 10<sup>4,7</sup> DICC50  
----- Excipients.....q.s.p.....1 dose
- Solvant : -----Eau pour préparations injectables..... 1 ml

### PROPRIETES PHARMACEUTIQUES :

Chez les chiens, la vaccination induit un état immunitaire contre le virus de la maladie de Carré, les adénoviroses, la parvovirose et les affections respiratoires à parainfluenza de type 2 du chien, démontré par épreuve virulente et par la présence d' anticorps séroneutralisants.

### INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Chez les chiens :

Immunsation active contre la maladie de Carré, les adénoviroses, la parvovirose et les affections respiratoires à parainfluenza de type 2.

### VOIE D'ADMINISTRATION ET POSOLOGIE :

Une dose de 1 ml par voie sous-cutanée, selon les modalités suivantes :

Reconstituer le vaccin par reprise du lyophilisat à l'aide du solvant.

- Primovaccination : --- 1ère injection : à partir de la 7ème semaine d'âge.  
----- 2ème injection : 3 à 5 semaines plus tard, mais pas avant la  
----- 12ème semaine d'âge.
- Rappels : ----- Annuels et avant toute entrée en milieu à risque (chenil, rassemblement,...)
- Mode d'administration :

Reconstituer le vaccin par reprise du lyophilisat à l'aide du solvant (les vaccins de Merial contre les leptospiroses et les leptospiroses associés à la rage peuvent servir de solvant).

### CONTRE-INDICATIONS :

Aucune

### PRECAUTIONS :

- Ne vacciner que les sujets en parfait état de santé et correctement vermifugés 10 jours au moins avant l'injection.
- Utiliser pour l' injection du matériel stérile et dépourvu de toute trace d'antiseptique et/ou désinfectant.

### DELAI D'ATTENTE :

Nul

### CONSERVATION :

Conserver au réfrigérateur entre + 2°C et + 8°C et à l'abri de la lumière.

Après reconstitution, utiliser le vaccin immédiatement.

### PRESENTATION :

Boîte de 10 flacons de 1 dose de lyophilisat  
et de 10 flacons de 1 ml de solvant.

## PRODUIT MERIAL