



Solution pour spot-on

Endectocide en spot-on pour chat à base de fipronil, S-méthoprène, éprinomectine et praziquantel

COMPOSITION :

Substances actives :
Chaque dose unitaire de l'applicateur délivre :

•BROADLINE solution pour spot-on pour chats <2,5 kg : dose unitaire 0,3 ml. Fipronil 24,9 mg. S-Méthoprène 30,0 mg. Eprinomectine 1,20 mg. Praziquantel 24,9 mg.

•BROADLINE solution pour spot-on pour chats de 2,5–7,5 kg : dose unitaire 0,9 ml. Fipronil 74,7 mg. S-Méthoprène 90,0 mg. Eprinomectine 3,60 mg. Praziquantel 74,7 mg.

•Excipient :

But ylhydroxytoluène (E321) 1 mg/ml.

INDICATIONS :

Chez les chats infestés ou à risque d'infestations mixtes par des cestodes, des nématodes et des ectoparasites. Le médicament vétérinaire est exclusivement indiqué lorsque les trois groupes sont ciblés en même temps.

Ectoparasites

Traitement et prévention des infestations par les puces (*Ctenocephalides felis*). Elimination des puces dans les 24 heures. Un traitement prévient les nouvelles infestations pendant au moins un mois.

-Prévention de la contamination de l'environnement par les puces, par inhibition du développement de tous les stades immatures de la puce (œufs, larves et pupes) pendant plus d'un mois.

-Traitement et prévention des infestations par les tiques (*Ixodes ricinus*). Elimination des tiques dans les 48 heures. Un traitement prévient les nouvelles infestations jusqu'à 3 semaines.

-Traitement de la gale notoédrique (*Notoedres cati*).

Nématodes

-Traitement des infestation par le nématode pulmonaire félin (larves L3, larves L4 et adultes d'*Aelurostrongylus abstrusus*).

PRÉCAUTIONS :

Ne pas utiliser chez les animaux malades ou convalescents.

Ne pas utiliser chez les lapins.

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité aux principes actifs ou à l'un des excipients.

Un agglomérat ou un hérissément transitoires des poils peut être observé au site d'application après le traitement.

Des réactions cutanées légères et transitoires au site d'application dérangeaisons, perte de poils peuvent se produire. L'ingestion du médicament vétérinaire peut aussi entraîner une salivation excessive des vomissements et/ou des signes neurologiques transitoires.

Tous ces signes disparaissent spontanément dans les 24 heures.

En cas de gravidité et de lactation, ne doit se faire qu'après évaluation du rapport bénéfice-risque établi par le vétérinaire.

POSOLOGIE :

Application spot-on.

Les doses minimales recommandées sont de 10mg/kg de poids corporel pour le fipronil, 12mg/kg pour le (S)-méthoprène, 0,5mg/kg pour l'éprinomectine et 10mg/kg pour le praziquantel. Choisir la taille de l'applicateur (ou une association d'applicateurs pour les chats > 7,5kg) appropriée en fonction du poids du chat.

DÉLAI D'ATTENTE :

Sans objet.

CONSERVATION:

Conserver dans son emballage commercial à température ≤ 25°C, à l'abri de la lumière.

Après ouverture: utilisation immédiate.

PRÉSENTATION(S):

Boîte de 3 applicateurs 0,3 ml chacun.

Boîte de 3 applicateurs 0,9 ml chacun.

