



Vaccin lyophilisé à virus vivant atténué contre la Fièvre de la Vallée du Rift des bovins et camélins

COMPOSITION :

Chaque dose de 2 ml du vaccin contient : Virus vivant atténué de la Fièvre de la Vallée du Rift, souche Clone 13T, au minimum 10^{4,5} DICT₅₀**

**Dose infectant 50 % de la culture tissulaire.

INDICATIONS :

Chez les bovins et camélins :
Immunisation active contre la Fièvre de la Vallée du Rift (FVR).

CONTRE-INDICATIONS :

Aucune.

MISES EN GARDE PARTICULIÈRES A CHAQUE ESPÈCE CIBLE :

Ne vacciner que les animaux en bonne santé.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D'EMPLOI CHEZ L'ANIMAL :

Aucune.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES À PRENDRE PAR LA PERSONNE QUI ADMINISTRE LE MÉDICAMENT AUX ANIMAUX :

- Éviter tout contact avec les yeux, les mains et les vêtements.
- En cas d'auto-injection accidentelle, demander immédiatement conseil à un médecin et montrer-lui la notice ou l'étiquetage.

AUTRES PRECAUTIONS :

- Respecter les conditions habituelles de manipulation des animaux.
- Mettre le vaccin reconstitué au frais et éviter son exposition directe au soleil et des températures élevées lors de la vaccination.
- Utiliser pour la vaccination et la préparation de la suspension vaccinale du matériel stérile dépourvu de toute trace d'antiseptique ou de désinfectant.
- Désinfecter le lieu d'inoculation et éviter tout traumatisme intempestif

EFFETS SECONDAIRES :

Aucun.

UTILISATION EN CAS DE GRAVIDITÉ OU DE LACTATION :

Le vaccin peut être utilisé durant la gestation et la lactation.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES FORMES D'INTERACTIONS :

Aucune information n'est disponible sur l'innocuité et l'efficacité de l'association de ce vaccin avec un autre médicament vétérinaire. En conséquence, la décision d'utiliser ce vaccin avant ou après un autre médicament vétérinaire doit être prise au cas par cas.

MODE, VOIE (S) D'ADMINISTRATION ET POSOLOGIE :

- Respecter les conditions générales d'asepsie.
- Avant la vaccination, le vaccin doit être remis en suspension dans son solvant stérile : à l'aide d'une seringue stérile, injecter 2 à 5 ml de solvant dans le flacon contenant la pastille lyophilisée. Après solubilisation totale de la pastille, transférer la suspension vaccinale dans le flacon contenant le reste du solvant puis remuer légèrement jusqu'à homogénéisation.
- Injection par voie sous-cutanée.

Posologie :

- Bovins et camélins : 2 ml, au niveau de l'encolure.





Programme de vaccination :

- Primo-vaccination:
 - A l'âge de 4 mois, pour les animaux issus de mères vaccinées.
 - A l'âge de 2 mois, pour les animaux issus de mères non vaccinées.

- Rappel :
Une injection annuelle avant chaque période à risque.

SURDOSAGE (SYMPTÔMES, CONDUITE D'URGENCE, ANTIDOTES) SI NÉCESSAIRE :

Aucun.

DÉLAI D'ATTENTE :

Zéro jour.

INCOMPATIBILITÉS :

Ne pas mélanger avec d'autres médicaments à l'exception du solvant fourni avec ce produit.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION :

Conserver et transporter à une température entre + 2°C et + 8°C, à l'abri de la lumière. Ne pas congeler.

Utiliser immédiatement après reconstitution.

PRÉSENTATION(S):

Flacon de 50 doses du vaccin lyophilisé et flacon de 100 ml du Solvant MCI.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES À PRENDRE LORS DE L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS NON UTILISÉS OU DE DÉCHETS DÉRIVÉS DE L'UTILISATION DE CES MÉDICAMENTS

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation locale sur les déchets.

